

施設別検査(施設血液透析患者;治療方法00)

	単位	全国		貴施設			
		調査年	平均値	平均値	最大値	最小値	患者数
週透析回数	回/週	2016	2.98	2.96	3	2	68
透析時間	分/回	2016	238.8	232.06	300.00	180.00	68
血流量	ml/分	2016	206.0	212.5	250	120	68
身長	cm	2016	160.1	160.3	183.0	137.0	68
透析前体重	kg	2010	56.7	59.6	117.3	36.1	68
透析後体重	kg	2016	55.8	57.3	112.5	34.6	68
透析前BUN	mg/dL	2016	59.8	63.7	140.0	30.0	68
透析後BUN	mg/dL	2008	20.6	18.4	36.0	8.0	68
透析前クレアチニン濃度	mg/dL	2016	10.14	9.3	14.00	3.40	68
透析後クレアチニン濃度	mg/dL	2008	4.12	3.41	5.60	1.20	68
透析前アルブミン濃度	g/dL	2016	3.54	3.46	4.0	2.0	68
透析前CRP濃度	mg/dL	2016	0.66	0.7	13.1	0.0	68
透析前補正カルシウム濃度	mg/dL	2016	9.16	8.85	10.40	6.90	68
透析前リン濃度	mg/dL	2016	5.17	5.33	12.5	2.7	68
intact PTH	pg/mL	2016	176.5	217.1	1070.0	26.0	68
whole PTH	pg/mL	2016	110.9				0
透析前ヘモグロビン濃度	g/dL	2016	10.77	10.99	13.2	8.2	68
総コレステロール濃度	mg/dL	2016	155.4	149.1	219	91	67
HDL-C濃度	mg/dL	2016	48.3	49.6	119	19	60
透析前収縮期血圧	mmHg	2016	151.2	150.0	216	104	68
透析前拡張期血圧	mmHg	2016	77.4	77.1	119	31	68
透析前脈拍	拍/分	2016	74.4	74.5	135	51	68
虚血性心疾患の既往あり患者割合	%	2016	10.4	100.0			18/ 18
脳出血の既往あり患者割合	%	2016	6.7	100.0			7/ 7
脳梗塞の既往あり患者割合	%	2016	18.8	100.0			11/ 11
四肢切断あり患者割合	%	2016	4.0	100.0			1/ 1
大腿骨頸部骨折の既往あり患者割合	%	2016	5.2	100.0			2/ 2
被嚢性腹膜硬化症(EPS)の既往あり患者割合	%	2016	8.9				0/ 0
降圧薬使用あり患者割合	%	2016	67.0	72.1			49/ 68
喫煙あり患者割合	%	2016	11.8	6.3			4/ 64
腹膜透析の経験あり患者割合	%	2016	3.4				0/ 0
腎移植の経験あり患者割合	%	2016	1.0				0/ 0
糖尿病の既往あり患者割合	%	2016	54.1	90.7			39/ 43
single pool Kt/V (Kt/Vsp)(週3回透析 透析歴2年以上)		2016	1.50	1.63	2.27	1.26	44
nPCR(週3回透析 透析歴2年以上)	g/kg/day	2016	0.85	0.93	1.74	0.54	44
%クレアチニン産生速度(週3回透析 透析歴2年以上)	%	2016	98.46	98.58	150.60	34.60	44

※2016年末全国値は「週3回透析」、BUN,Cr,Kt/V,nPCR,%CGRは「週3回透析、透析歴2年以上」で出力しています。

貴施設集計は、Kt/V,nPCR,%CGRのみ「週3回透析、透析歴2年以上」で出力しています。

※「被嚢性腹膜硬化症(EPS)の既往あり患者割合」は、全国値も貴施設集計も「腹膜透析の経験」項目が『B:あり』の患者を対象に出力しています。