

令和元年6月3日

関係者各位

伊那中央病院  
院長 本郷 一博

### 「CT造影検査」紹介時の服薬指導について（お願い）

初夏の候、皆様には尚一層ご活躍のこととお慶び申し上げます。

平素より地域医療連携について格別のご理解ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、造影CT検査等で使用するヨード系造影剤とビグアナイド系糖尿病治療薬の併用により乳酸アシドーシスを起こすことがあり、当院で検査を受けられる患者様にその治療薬の服用を一時的に中止していただく必要があります。

つきましては、当院への造影検査紹介時には、下記の通り服薬制限について患者様にご指導、ご説明くださいますようお願い申し上げます。

ご不明な点がございましたら、地域医療連携室までお問い合わせください。

#### 記

- 1 造影検査前2日間および造影検査当日は、ビグアナイド系糖尿病治療薬（表Iご参照）の服用中止をお願い致します。ただし、緊急の検査を必要とする場合は、除外します。
- 2 造影検査終了後2日間もビグアナイド系糖尿病治療薬の服用を再開しないようお願いいたします。また、造影検査終了後、患者様の腎機能回復に不安がある場合は、貴院のご判断で再開時期をさらに延期するなどのご検討をお願い致します。
- 3 当院へのCT造影検査の依頼をされる際、診療情報提供書（検査用）の「患者へのビグアナイド系糖尿病治療薬の服用中止の説明済」の欄に✓をお願い致します。

表I ビグアナイド剤一覧

一般名	商品名・規格
メトホルミン 塩酸塩	メトホルミン錠 250 mg MT 500 mg MT
	メトホルミン錠 250 mg 500 mg
	メトグルコ錠 250 mg 500 mg
	グリコラン錠 250 mg
配合剤	エクメット配合錠 LD、HD
	イニシンク配合錠 LD、HD
	メトアナ配合錠
	メタクト配合錠 LD、HD
ブホルミン 塩酸塩	ジベトス錠 50 mg
	ジベトンS腸溶錠 50 mg

伊那中央病院 地域医療連携室  
電話 0265-78-8623  
FAX 0265-74-2234