

施設別集計(腹膜透析患者 血液透析との併用含む;治療方法50~52)

	単位	全国	
		調査年	平均値
身長	cm	2018	161.2
体重	kg	2018	61.8
BUN	mg/dL	2018	55.8
クレアチニン濃度	mg/dL	2018	9.72
アルブミン濃度	g/dL	2018	3.22
CRP濃度	mg/dL	2018	0.64
補正カルシウム濃度	mg/dL	2018	9.27
リン濃度	mg/dL	2018	5.23
intact PTH	pg/mL	2018	229.0
whole PTH	pg/mL	2018	138.2
ヘモグロビン濃度	g/dL	2018	10.98
総コレステロール濃度	mg/dL	2018	176.7
HDL-C濃度	mg/dL	2018	51.5
収縮期血圧	mmHg	2018	142.2
拡張期血圧	mmHg	2018	79.1
脈拍	拍/分	2018	78.2

現在施行中のPD歴	年	2018	3.07
調査年中のPD実施月数	月	2018	
PET施行率	%	2018	64.8
PET Cr D/P比		2018	0.67
イコデキストリン透析使用患者割合	%	2018	54.4
1日透析液使用量	L/日	2018	6.46
残存腎機能(1日尿量)	mL/日	2018	651.3
1日平均除水量	mL/日	2018	665.3
残腎Kt/V		2018	0.59
PD Kt/V		2018	1.21
APD(自動腹膜透析装置)使用患者割合	%	2018	44.6
1日のPD実施時間	時間/日	2018	
PD透析液交換方法完全手動式患者割合	%	2018	25.5
調査年中の腹膜炎罹患あり患者割合	%	2018	12.7
調査年中の出口部感染罹患あり患者割合	%	2018	18.9

虚血性心疾患の既往あり患者割合	%	2018	18.7
脳出血の既往あり患者割合	%	2018	4.3
脳梗塞の既往あり患者割合	%	2018	12.6
四肢切断あり患者割合	%	2018	1.5
大腿骨頸部骨折の既往あり患者割合	%	2018	3.0
被嚢性腹膜硬化症(EPS)の既往あり患者	%	2018	0.5
降圧薬使用あり患者割合	%	2018	80.7
喫煙あり患者割合	%	2018	9.2
腎移植の経験あり患者割合	%	2018	1.0
糖尿病の既往あり患者割合	%	2018	49.8

平均値	最大値	最小値	患者数
59.9	78.1	50.4	6
72.8	105.0	57.0	6
8.4	14.0	5.4	7
3.35	4.2	2.7	6
0.3	0.9	0.0	6
9.12	10.00	8.50	6
5.85	8.90	4.40	6
271.6	699.0	72.0	7
			0
11.1	12.6	9.3	7
			0
51.1	83	38	7
127.0	127	127	1
57.0	57	57	1
60.0	60	60	1

0.7	1.4	0.2	7
6.4	12.0	2.0	7
0.0			0/7
			0
28.6			2/7
1.9	3.0	1.0	7
1200.0	1200	1200	1
364.3	1200	-150	7
			0
			0
0.0			0/7
			0
0.0			0/7
0.0			0/7
14.3			1/7

14.3			1/7
0.0			0/7
0.0			0/7
0.0			0/7
0.0			0/7
0.0			0/7
100.0			7/7
14.3			1/7
0.0			0/7
42.9			3/7