

施設別集計(血液透析患者; 治療方法00-40*)

*00-40は体外循環を用いた透析療法(施設血液透析、血液透析濾過、血液濾過、血液吸着透析、在宅血液透析を含む)

	単位	全国	
		調査年	平均値
週透析回数	回/週	2018	
透析時間	分/回	2018	241.3
血流量	ml/分	2018	212.6
身長	cm	2018	160.6
透析前体重	kg	2018	59.3
透析後体重	kg	2018	56.8
透析前BUN	mg/dL	2018	59.9
透析後BUN	mg/dL	2018	18.0
透析前クレアチニン濃度	mg/dL	2018	9.76
透析後クレアチニン濃度	mg/dL	2018	3.63
透析前アルブミン濃度	g/dL	2018	3.55
透析前CRP濃度	mg/dL	2018	0.64
透析前補正カルシウム濃度	mg/dL	2018	9.10
透析前リン濃度	mg/dL	2018	5.21
intact PTH	pg/mL	2018	170.7
whole PTH	pg/mL	2018	108.4
透析前ヘモグロビン濃度	g/dL	2018	10.89
総コレステロール濃度	mg/dL	2018	156.9
HDL-C濃度	mg/dL	2018	49.2
透析前収縮期血圧	mmHg	2018	151.3
透析前拡張期血圧	mmHg	2018	77.9
透析前脈拍	拍/分	2018	74.4

貴施設			
平均値	最大値	最小値	患者数
2.91	3	2	47
225.32	270.00	150.00	47
228.9	250	110	47
162.3	183.0	144.0	47
61.6	119.6	40.4	47
59.5	114.5	39.9	47
59.5	128.0	29.0	46
16.2	32.0	7.0	46
9.9	14.40	3.40	46
3.61	7.00	1.60	46
3.62	4.3	2.5	46
0.5	5.7	0.0	46
9.06	11.00	8.00	46
5.49	12.9	2.5	46
199.7	690.0	5.0	47
			0
11.80	15.6	8.4	47
137.7	218	89	43
54.8	120	24	42
151.9	207	104	47
76.0	103	28	47
73.4	110	42	47

虚血性心疾患の既往あり患者割合	%	2018	25.3
脳出血の既往あり患者割合	%	2018	6.7
脳梗塞の既往あり患者割合	%	2018	19.0
四肢切断あり患者割合	%	2018	4.0
大腿骨頸部骨折の既往あり患者割合	%	2018	5.4
被嚢性腹膜硬化症(EPS)の既往あり患者割合	%	2018	8.8
降圧薬使用あり患者割合	%	2018	66.7
喫煙あり患者割合	%	2018	11.4
腹膜透析の経験あり患者割合	%	2018	3.7
腎移植の経験あり患者割合	%	2018	1.2
糖尿病の既往あり患者割合	%	2018	55.1

21.3			10/ 47
8.5			4/ 47
12.8			6/ 47
4.3			2/ 47
6.4			3/ 47
0.0			0/ 2
72.3			34/ 47
4.3			2/ 47
4.3			2/ 47
0.0			0/ 47
59.6			28/ 47

single pool Kt/V (Kt/Vsp)(週3回透析 透析歴2年以上)		2018	1.53
nPCR(週3回透析 透析歴2年以上)	g/kg/day	2018	0.86
%クレアチニン産生速度(週3回透析 透析歴2年以上)	%	2018	98.60

1.57	2.29	0.69	41
0.85	1.53	0.51	41
95.27	162.70	14.10	41

貴施設集計は、Kt/V,nPCR,%OGRのみ「週3回透析、透析歴2年以上」で出力しています。
 ※「被嚢性腹膜硬化症(EPS)の既往あり患者割合」は、全国値も貴施設集計も「腹膜透析の経験」項目が「あり(B,C)」の患者を対象に出力しています。