

イリノテカン+シスプラチン療法 (トポテシン+ランダ)


様



コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目		
			1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28	1/29		
ソルデム3A輸液 硫酸マグネシウム	腎臓を保護します	2時間	☒																														☒
ホスアプレピタント(プロイメンド) パロノセトロン(アロキシ) デキサメタゾン(デキサート)	吐き気止めです	30分	☒							☒							☒																☒
デキサメタゾン(デキサート)	吐き気止めです	15分		☒	☒																												
イリノテカン(トポテシン)	抗がん剤です	90分	☒	☒	☒	☒				☒							☒																☒
マンニトール注	利尿薬です	45分	☒																														☒
シスプラチン(ランダ)	抗がん剤です	2時間	☒																														☒



腎臓を保護するため、たくさんのお水を点滴します。無理のない程度に水分補給をして、頻りに尿を出しましょう。

😊 **治療による副作用**

注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目				
		1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28	1/29				
		水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水				
自覚症状	食欲不振・吐き気																																	
	下痢																																	
	手足のしびれ																																	
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																																	
検査値	白血球減少																																	
	赤血球減少(貧血)																																	
	血小板減少																																	
	腎機能低下																																	

* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
 * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
 * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
 * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。