

FOLFIRI(イリノテカン+レボホリナート・フルオロウラシル)療法

(トポテシン+アイソボリン+5-FU)

様 コース目

☺ **お薬の名前と治療のスケジュール**(副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目
			1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28	1/29
パロセトロン(アロキシ) デキサメタゾン(デキサート)	吐き気止めです	15分	☒														☒														☒
イリノテカン(トポテシン)	抗がん剤です	2時間	☒															☒													☒
レボホリナート(アイソボリン)	5-FUの効果を高める薬です		☒																☒												☒
フルオロウラシル(5-FU)	抗がん剤です	約5分	☒															☒													☒
フルオロウラシル(5-FU) (持続)	抗がん剤です	46時間	☒	☒														☒	☒												☒

☺ **治療による副作用** : 注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目	
		1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28	1/29	
自覚症状	食欲不振・吐き気																														
	口内炎																														
	下痢																														
	色素沈着																														
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																														
検査値	白血球減少																														
	赤血球減少(貧血)																														
	血小板減少																														

☺

- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。