

トラスツズマブ＋FOLFOX(オキサリプラチン＋レボホリナート＋フルオロウラシル)療法 (ハーセプチン＋エルプラット＋アイソボリン＋5-FU)

様

コース目



お薬の名前と治療のスケジュール(副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目				
			1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28	1/29				
トラスツズマブ(ハーセプチン)	抗がん剤です	90→60→30分	☒																					☒										☒	
ホスアプレピタント(プロイメンド) パロノセトロン(アロキシ) デキサメタゾン(デキサート)	吐き気止めです	30分	☒														☒																		☒
オキサリプラチン(エルプラット)	抗がん剤です	2時間	☒														☒																		☒
レボホリナート(アイソボリン)	5-FUの効果を強める薬です		☒														☒																		☒
フルオロウラシル(5-FU)	抗がん剤です	約5分	☒														☒																		☒
フルオロウラシル(5-FU)(持続)	抗がん剤です	46時間	☒														☒																		☒

2回目から点滴時間が短くなる場合があります。

この週はお休みです。



治療による副作用

:注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目						
		1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28	1/29						
自覚症状	過敏症																																			
	食欲不振・吐き気																																			
	手足のしびれ																																			
	口内炎																																			
	色素沈着																																			
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																																			
検査値	白血球減少																																			
	赤血球減少(貧血)																																			
	血小板減少																																			
	肝機能低下																																			



* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
 * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
 * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
 * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。