

ペルツズマブ+トラスツズマブ+パクリタキセル療法

(パージェタ+ハーセプチン+タキソール)

様



コース目

お薬の名前と治療のスケジュール (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
			1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22
クロルフェニラミン(ボラミン) ファモチジン(ガスター) デキサメタゾン(デキサート)	吐き気止めです	15分	☺							☺							☺							☺
ペルツズマブ(パージェタ)	抗がん剤です	60分→30分	☺							休							休							☺
生理食塩液		30分	☺							☺							☺							☺
トラスツズマブ(ハーセプチン)	抗がん剤です	90分→60分→30分	☺							休							休							☺
生理食塩液		5分	☺							—							—							☺
パクリタキセル(タキソール)	抗がん剤です	60分	☺							☺							☺							☺
生理食塩液		5分	☺							☺							☺							☺

2回目から投与時間が短くなる場合があります。

2回目から投与時間が短くなる場合があります。

治療による副作用

：注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目		
		1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22		
自覚症状	アレルギー様症状																								
		発熱や寒気、吐き気、頭痛、めまい、じんましん、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせ下さい。																							
	食欲不振・吐き気																								
		食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。																							
	関節痛・筋肉痛																								
		肩や背中、腰や腕などの筋肉が痛くなったり、関節が痛くなることがあります。																							
口内炎																									
	口の中が荒れて痛みが出ることがあります。歯磨き、うがいなど丁寧にしっかりと行いましょう。																								
手足のしびれ																									
	手足のしびれ、感覚が鈍などの症状が出ることがあります。																								
脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																									
	髪質が少し変わることもありますが、治療後半年程度でまた生えてきますので、心配すぎないでください。																								
検査値	白血球減少																								
		感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。																							
	赤血球減少(貧血)																								
		貧血の症状(めまい・ふらつき)がでたりします。転倒に注意しましょう。																							
血小板減少																									
	出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。																								
肝機能低下																									
	体がだるい、食欲がでない、皮膚のかゆみ、皮膚や白目が黄色くなる場合があります。																								

心機能低下(治療回数が増えると生じることがあります。息苦しさなどがありましたらお知らせ下さい。)
手や足のむくみ(治療回数が増えると生じることがあります。気になる症状がありましたらお知らせ下さい。)
爪の変化(爪の変色、爪の周囲が赤くなったり痛いなどの症状がありましたらお知らせ下さい。)



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

パクリタキセルは、水に溶けにくいのでアルコールで溶解されています。お酒が弱い方、飲めない方は、前もってお伝えください。治療当日は自動車の運転など危険を伴う作業は避けてください(交通事故を起こす危険性や、酒気帯び運転になる可能性があります)