

# トラスツズマブ+パクリタキセル療法 (ハーセプチン+タキソール)

様

コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目	
			1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28	1/29	
トラスツズマブ(ハーセプチン)	抗がん剤です	90→60→30分	☺							☺							☺						☺									☺
クロルフェニラミン(ポララミン) ファモチジン(ガスター) デキサメタゾン(デキサート)	過敏症と吐き気を抑えるお薬です	5-15分	☺							☺							☺						☺									☺
生理食塩液	パクリタキセルまでのつなぎ	30分	☺							☺							☺						☺									☺
パクリタキセル(タキソール)	抗がん剤です	1時間	☺							☺							☺						☺									☺
生理食塩液		5分	☺							☺							☺						☺									☺

1日目は吐き気止めを先に点滴します。

## 😊 治療による副作用

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目		
		1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28	1/29		
自覚症状	アレルギー様症状																															
	過敏症																															
	食欲不振・吐き気																															
	関節痛・筋肉痛																															
	口内炎																															
	手足のしびれ																															
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																															
検査値	白血球減少																															
	赤血球減少(貧血)																															
	血小板減少																															
	肝機能低下																															

ハーセプチン: 心機能低下 (治療回数が増えると生じることがあります。息苦しさなどがありましたらお知らせ下さい。)



- \* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- \* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- \* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- \* 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

パクリタキセルは、水に溶けにくいのでアルコールで溶解されています。お酒が弱い方、飲めない方は、前もってお伝えください。治療当日は自動車の運転など危険を伴う作業は避けてください(交通事故を起こす危険性や、酒気帯び運転になる可能性があります)