

パクリタキセル アルブミン懸濁剤＋ベバシズマブ療法 (アブラキサン＋アバステン)


様

コース目

☺ **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強が残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

| 薬の名前 | 作用 | めやすの時間 | 1日目 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1日目 | |
|-----------------------------------|---------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| | | | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | |
| グラニセトロン(カイトリル) デキサメタゾン(デキササート) | 吐き気止めです | 15分 | ☺ | | | | | | | ☺ | | | | | | | ☺ | | | | | | | | | | | | | | | ☺ |
| パクリタキセル アルブミン懸濁剤 (アブラキサン) | 抗がん剤です | 30分 | ☺ | | | | | | | ☺ | | | | | | | ☺ | | | | | | | | | | | | | | | ☺ |
| 生理食塩液 | | 5分 | ☺ | | | | | | | — | | | | | | | ☺ | | | | | | | | | | | | | | ☺ | |
| ベバシズマブ(アバステン) | 抗がん剤です | 90分→60分 →30分 | ☺ | | | | | | | 休 | | | | | | | ☺ | | | | | | | | | | | | | | ☺ | |
| 生理食塩液 | | 5分 | ☺ | | | | | | | ☺ | | | | | | | ☺ | | | | | | | | | | | | | | ☺ | |

2回目から投与時間が短くなる場合があります。90分→60分→30分



☺ **治療による副作用**

注意が必要な時期

| | 1日目 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1日目 | | |
|-----------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | | |
| 自覚症状 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 過敏症 | 痒みや顔のほてり、じんましん、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせ下さい。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 食欲不振・吐き気 | 食欲低下や吐き気がする場合があります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 筋肉痛・関節痛 | 肩や背中、腰や腕などの筋肉が痛くなったり、関節が痛くなることがあります。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 口内炎 | 口の中が荒れて痛みが出る場合があります。歯磨き、うがいなど丁寧にしっかりと行いましょう。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 手足のしびれ | 手足のしびれ、感覚が鈍などの症状が出る場合があります。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など) | 髪質が少し変わることもありますが、治療後半年程度でまた生えてきますので、心配しすぎないでください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 検査値 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 白血球減少 | 感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 赤血球減少(貧血) | 貧血の症状(めまい・ふらつき)がでたりします。転倒に注意しましょう。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 血小板減少 | 出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 肝機能低下 | 体がだるい、食欲がでない、皮膚のかゆみ、皮膚や白目が黄色くなる場合があります。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

以下の副作用は、アバステンによるもので起こりやすい時期はわかっていますが、早めの対応が必要な副作用です。気づいたことがあればお知らせください。

- 血圧上昇 ● 出血(鼻血など) ● タンパク尿 ● 胃腸穿孔(下痢や腹痛が続く、激しい腹痛など) ● 傷の治りが遅い
- 血栓・塞栓(足が腫れたり痛む、息苦しい、胸痛、片側のまひ、言葉がうまく出ない、気分が悪い、めまいなど)



* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
 * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
 * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
 * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。