

アテゾリズマブ+ベバシズマブ+パクリタキセル+カルボプラチン療法

(テセントリク+アバステン+タキソール+パラプラチン)

様

コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
			1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22
アテゾリズマブ(テセントリク)	抗がん剤です	60→30分	💉																					💉
ベバシズマブ(アバステン)	抗がん剤です	90分→60分→30分	💉																					💉
ホスアプレピタント(プロイメンド) パロノセトロン(アロキシ) デキサメタゾン(デキサート) ファモチジン(ガスター) クロルフェニラミン(ポララミン)	過敏症・吐き気を抑えるお薬です	30分	💉																					💉
生理食塩液		30分	💉																					💉
パクリタキセル(タキソール)	抗がん剤です	3時間	💉																					💉
カルボプラチン(パラプラチン)	抗がん剤です	1時間	💉																					💉

2回目から投与時間が短くなる場合があります。

この週はお休みです。

この週はお休みです。

😊 治療による副作用

注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目	
		1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	
自覚症状	過敏症																							
	食欲不振・吐き気	痒みや顔のほてり、じんましん、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせ下さい。																						
	筋肉痛・関節痛	食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。																						
	口内炎	肩や背中、腰や腕などの筋肉が痛くなったり、関節が痛くなることがあります。																						
	手足のしびれ	口の中が荒れて痛みが出ることがあります。歯磨き、うがいなど丁寧にしっかり行いましょう。																						
	便秘	手足のしびれ、感覚が鈍るなどの症状が出ることがあります。																						
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)	水分を多めに摂りましょう。続く場合はお薬で調節した方が良いので、お知らせ下さい。																						
検査値	白血球減少	髪質が少し変わることもあります。治療後半年程度でまた生えてきますので、心配しすぎないでください。																						
	赤血球減少(貧血)	感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。																						
	血小板減少	貧血の症状(めまい・ふらつき)がでたりします。転倒に注意しましょう。																						
	肝機能低下	出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。																						

以下の副作用は、起こりやすい時期はわかっていませんが、早めの対応が必要な副作用です。気づいたことがあればお知らせください。

- 血圧上昇 ● 出血(鼻血など) ● タンパク尿 ● 胃腸穿孔(下痢や腹痛が続く、激しい腹痛など) ● 傷の治りが遅い
- 血栓・塞栓(足が腫れたり痛む、息苦しい、胸痛、片側のまひ、言葉がうまく出ない、気分が悪い、めまいなど)

★アテゾリズマブはこの他に特徴的な副作用があります。詳しくはアテゾリズマブのパンフレットをご覧ください。

パクリタキセルは、水に溶けにくいためアルコールで溶解されています。お酒が弱い方、飲めない方は、前もってお伝えください。治療当日は自動車の運転など危険を伴う作業は避けてください(交通事故を起こす危険性や、酒気帯び運転に)



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。