

ベバシズマブ+エルロチニブ療法 (アバスチン+タルセバ)

様 コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
			1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22
			水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
ベバシズマブ(アバスチン)	抗がん剤です	90→60→30分																						
エルロチニブ錠(タルセバ)	抗がん剤です	1日1回 空腹時 内服																						

😊 治療による副作用

			1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目	
			1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	
			水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	
自覚症状	食欲不振・吐き気																								
		食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。																							
	口内炎																								
		口の中が荒れて痛みが出ることがあります。歯磨き、うがいなど丁寧にしっかりと行いましょう。																							
	下痢																								
	便の回数が多くなったり強い腹痛をとまったり、水の様な便が出る時はお知らせ下さい。																								
皮膚障害(ニキビ様皮疹、爪囲炎など)																									
	にきびのような発疹が起きたり、皮膚が乾燥してひび割れができることがあるので、保湿剤を使うなどして予防しましょう。																								
間質性肺炎																									
	感染症による肺炎ではなく、肺に炎症が起こることで発現します。ごくまれにしか起こりませんが、早めの対応が必要です。																								
検査値	肝障害																								
		顔や手足のむくみ、尿が少ない・出ないなどの症状が出ることがあります。																							
	腎障害																								
		体がだるい、食欲がでない、皮膚のかゆみ、皮膚や白目が黄色くなるがあります。																							

以下の副作用は、ベバシズマブによるものです。早めの対応が必要な副作用です。気づいたことがあればお知らせください。
 ●血圧上昇 ●出血(鼻血など) ●タンパク尿 ●胃腸穿孔(下痢や腹痛が続く、激しい腹痛など) ●傷の治りが遅い
 ●血栓・塞栓(足が腫れたり痛む、息苦しい、胸痛、片側のまひ、言葉がうまく出ない、気分が悪い、めまいなど)



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

伊那中央病院薬剤科