

# AI(ドキシソルピシン+イホスファミド)療法

(アドリアシン+イホマイド)

様

□ コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、治療のお薬の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
			1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22
パロノセトロン(アロキシ) ホスアプレピタント(プロイメンド) デキサメタゾン(デキサート)	吐き気止めです	30分	🚰	—	—	—	—																	🚰
デキサメタゾン(デキサート)	吐き気止めです	15分	—	🚰	🚰	🚰	🚰																	—
生理食塩液		5分	🚰	🚰	🚰	🚰	🚰																	🚰
ドキシソルピシン(アドリアシン)	抗がん剤です	2時間	🚰	🚰	休	休	休																	🚰
生理食塩液		10分	🚰	🚰	—	尿の色が赤くなることがあります。																		🚰
イホスファミド(イホマイド)	抗がん剤です	4時間	🚰	🚰	🚰	🚰	🚰																	🚰
メイロン	膀胱を保護します	2時間	🚰	🚰	🚰	🚰	🚰																	🚰
ウロミテキサン(メスナ)	膀胱を保護します	5~10分×3本	📄	📄	📄	📄	📄																	📄
輸液 (ソリアセトFなど)	膀胱を保護します	2時間×3~4本	🚰	🚰	🚰	🚰	🚰	🚰	🚰															🚰

🧒 この週はお休みです。

🧒 この週はお休みです。

🗣️ 膀胱を保護するため、たくさんの輸液を点滴します。  
無理のない程度に水分補給をして、頻繁に尿を出しましょう。

## 😊 治療による副作用

📅 : 注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目	
		1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	
自覚症状	食欲不振・吐き気																							
	出血性膀胱炎(血尿・排尿痛)																							
	口内炎																							
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																							
検査値	白血球減少																							
	赤血球減少(貧血)																							
	血小板減少																							

🗣️ 心機能低下(ドキシソルピシン)・・・治療回数が増えると生じることがあります。息苦しさなどがありましたらお知らせ下さい。

🧒 \* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。  
\* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。  
\* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。  
\* 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。