

# AP(ドキシソルピシン+シスプラチン)療法

(アドリアシン+ランダ)

様

コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
			1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22
硫酸マグネシウム	腎臓を守ります	2時間	☺																					☺
ホスアプレピタント(プロイメンド) パロノセトロン(アロキシ) デキサメタゾン(デキサート)	吐き気止めです	30分	☺																					☺
デキサメタゾン(デキサート)	吐き気止めです	15分	—	☺	☺																			—
ドキシソルピシン(アドリアシン)	抗がん剤です	約10分	☺																					☺
マンニトール	尿を出しやすくします	45分	☺																					☺
シスプラチン(ランダ)	抗がん剤です	2時間	☺																					☺
ソルアセトF		約5~6時間	☺	☺	☺																			☺

尿の色が赤くなることがあります。

この週はお休みです。

この週はお休みです。

腎臓を保護するため、たくさんの輸液を点滴します。無理のない程度に水分補給をして、頻繁に尿を出しましょう。

## 😊 治療による副作用

注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目	
		1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	
自覚症状	食欲不振・吐き気																							
	口内炎																							
	脱毛(頭髮・まつ毛・眉毛など)																							
検査値	白血球減少																							
	赤血球減少(貧血)																							
	血小板減少																							
	肝機能低下																							
	腎機能低下																							

心機能低下(治療回数が増えると生じることがあります。息苦しさなどがありましたらお知らせ下さい。)



- \* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- \* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- \* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- \* 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。