

# TIP(パクリタキセル+イホスファミド+シスプラチン)療法

(タキソール+イホマイド+ランダ)

様

コース目

☺ **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、治療のお薬の影響が強が残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
			1/1 水	1/2 木	1/3 金	1/4 土	1/5 日	1/6 月	1/7 火	1/8 水	1/9 木	1/10 金	1/11 土	1/12 日	1/13 月	1/14 火	1/15 水	1/16 木	1/17 金	1/18 土	1/19 日	1/20 月	1/21 火	1/22 水
パロノセトロン(アロキシ) ホスアプレピタント(プロイメド) デキサメタゾン(デキサート)	吐き気止めです	30分	☺	—	—																			☺
デキサメタゾン(デキサート)	吐き気止めです	15分	—	☺	☺																			—
生理食塩液		5分	☺	☺	☺																			☺
イホスファミド(イホマイド)	抗がん剤です	2時間	☺	☺	☺																			☺
ウロミテキサン(メスナ)	膀胱を保護します	5~10分 × 3本	☺	☺	☺																			☺
メイロン	膀胱を保護します	2時間	☺	☺	☺																			☺
ファモチジン(ガスター) クロルフェニラミン(ボララミン)	アレルギー予防です	30分	☺	—	—																			☺
生理食塩液		30分	☺	—	—																			☺
パクリタキセル(タキソール)	抗がん剤です	3時間	☺	休	休																			☺
マンニトール	利尿剤です	45分	☺	☺	☺																			☺
シスプラチン(ランダ)	抗がん剤です	2時間	☺	☺	☺																			☺
硫酸マグネシウム	腎臓を保護します	2時間	☺	☺	☺																			☺
輸液(ソルアセト、ソルデムなど)		2時間 × 1~4本 (日によって異なります)	☺	☺	☺	☺	☺																	☺

この週はお休みです。

この週はお休みです。

イホマイド開始時、開始4時間後、開始8時間後に使用します。

膀胱を保護するため、たくさんの輸液を点滴します。無理のない程度に水分補給をして、頻繁に尿を出しましょう。

## ☺ 治療による副作用

注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目	
		1/1 水	1/2 木	1/3 金	1/4 土	1/5 日	1/6 月	1/7 火	1/8 水	1/9 木	1/10 金	1/11 土	1/12 日	1/13 月	1/14 火	1/15 水	1/16 木	1/17 金	1/18 土	1/19 日	1/20 月	1/21 火	1/22 水	
自覚症状	食欲不振・吐き気																							
	出血性膀胱炎(血尿・排尿痛)																							
	口内炎																							
	手足のしびれ																							
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																							
検査値	白血球減少																							
	赤血球減少(貧血)																							
	血小板減少																							



- \* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- \* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- \* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- \* 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。