

EP(エトポシド+シスプラチン)療法



(ラステット+ランダ)

様



😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20
			水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
硫酸マグネシウム	腎臓を守ります	2時間																				
生理食塩液		5分																				
ホスファプリタント(フロイメンド)	吐き気止めです	30分		—	—	—	—															
グラニセロン(カイトリル) デキサメタゾン(デキサート)	吐き気止めです	15分	—																			
マンニトール	利尿剤です	45分																				
シスプラチン(ランダ)	抗がん剤です	2時間																				
エトポシド(ラステット)	抗がん剤です	2時間																				
ソリアセトF		1時間																				



腎臓を保護するため、たくさんの輸液を点滴します。無理のない程度に水分補給をして、頻りに尿を出しましょう。



😊 治療による副作用

注意が必要

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	
		水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	
自覚症状	食欲不振・吐き気																					
	口内炎																					
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																					
	手足のしびれ																					
検査値	白血球減少																					
	赤血球減少(貧血)																					
	血小板減少																					
	腎機能低下																					
	肝機能低下																					

* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。



- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したもので、必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

病院薬剂科