

セツキシマブ+シスプラチン+フルオロウラシル療法 (アービタックス+ランダ+5-FU)

様

コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
			1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22
ソルデム3A輸液 硫酸マグネシウム	腎臓を保護します	2時間	☒																					☒
ホスアプレピタント(プロイメド) パロノセトロン(アロキシ) デキサメタゾン(デキサート) クロルフェニラミン(ポラミン)	吐き気止めです	30分	☒																					☒
デキサメタゾン(デキサート)	吐き気止めです	15分		☒	☒	☒																		
デキサメタゾン(デキサート) クロルフェニラミン(ポラミン)	吐き気止めです	15分								☒								☒						
セツキシマブ(アービタックス)	抗がん剤です	2→1時間	☒										☒											☒
生理食塩液		1時間→15分	☒										☒											☒
マンニトール注	利尿剤です	45分	☒																					☒
フルオロウラシル(5-FU)	抗がん剤です	24時間	☒	☒	☒	☒																		☒
シスプラチン(ランダ)	抗がん剤です	2時間	☒																					☒

2回目から投与時間が1時間になります。

2回目から投与時間が15分になります。
(セツキシマブのみ投与の日は1時間)

腎臓を保護するため、たくさんの輸液を点滴します。
無理のない程度に水分補給をして、頻繁に尿を出しましょう。

😊 **治療による副作用**

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目	
		1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	
自覚症状	食欲不振・吐き気																							
		食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。																						
	口内炎																							
		口の中が荒れて痛みが出ることがあります。歯磨き、うがいなど丁寧にしっかり行いましょう。																						
	下痢																							
		便の回数が多くなったり強い腹痛をとまったり、水の様な便が出る時はお知らせ下さい。																						
手足のしびれ																								
	手足のしびれ、感覚が鈍るなどの症状が出ることがあります。																							
脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																								
	髪質が少し変わることもありますが、治療後半年程度でまた生えてきますので、心配しすぎないでください。																							
皮膚障害(ニキビ様皮疹、爪囲炎など)																								
	皮疹が出てきたらステロイド軟膏を塗って下さい。ふだんから保湿剤を塗りましょう。																							
検査値	白血球減少																							
		感染しやすくなりますので、手洗いうがいなどを心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。																						
	赤血球減少(貧血)																							
		貧血の症状(めまい・ふらつき)がでたりします。転倒に注意しましょう。																						
血小板減少																								
	出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。																							
腎機能低下																								
	顔や手足のむくみ、尿が少ない・出ないなどの症状が出ることがあります。																							



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。