

# エスワン+シスプラチン療法(ショートハイドレーション法) (ティーエスワン+ランダ)

ID @PATIENTID

@PATIENTNAME 様

□ コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強に残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	1日目	
エスワン錠(ティーエスワン)	抗がん剤です	朝・夕 内服	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	
アプレピタントカプセル(イメンド)	吐き気止めです	1日1回 内服								📄	📄	📄																											📄
パロノセトロン(アロキシン) デキサメタゾン(デキササート)	吐き気止めです	15分								📄																													
ソルデム1輸液 硫酸マグネシウム アスパラギン散カリウム	腎臓への負担を減らします	1時間								📄																													
マンニトール	利尿薬です	45分								📄																													
シスプラチン(ランダ)	抗がん剤です	1時間								📄																													
ソルデム1輸液 アスパラギン散カリウム	腎臓への負担を減らします	1時間								📄																													

1回 (1日) 錠ずつ錠

1日目は、抗がん剤の投与開始前に飲みます。



この週はお休みです。

この週はお休みです。

腎臓を保護するため、経口での水分補給をして頻りに尿を出しましょう。

😊 **治療による副作用**

注意が必要な時期

	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	1日目			
食欲不振・吐き気																																							
皮膚																																							
下痢																																							
口内炎																																							
色素沈着																																							
手足のしびれ																																							
脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																																							
白血球減少																																							
赤血球減少(貧血)																																							
血小板減少																																							
腎機能低下																																							
肝機能低下																																							



\* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。  
 \* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。  
 \* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。  
 \* 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。