


ネダプラチン+フルオロウラシル療法 (アクブラ+5-FU)

ID @PATIENTID

@PATIENTNAME 様



コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目		
			SYSDA	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####
ホスアプレビタント(プロイメンド) パロノセトロン(アロキシ) デキサメタゾン(デキサート)	吐き気止めです	30分																															
デキサメタゾン(デキサート)	吐き気止めです	15分																															
ネダプラチン(アクブラ)	抗がん剤です	2時間																															
フルオロウラシル(5-FU)	抗がん剤です	24時間																															

この週はお休みです。

この週はお休みです。

この週はお休みです。

腎臓を保護するため、たくさんの輸液を点滴します。無理のない程度に水分補給をして、頻繁に尿を出しましょう。

😊 治療による副作用

: 注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目				
		@SYSDA	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####		
		@SYSDA	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####		
自覚症状	食欲不振・吐き気																																	
	口内炎																																	
	下痢																																	
	手足のしびれ																																	
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																																	
検査値	白血球減少																																	
	赤血球減少(貧血)																																	
	血小板減少																																	
	腎機能低下																																	

* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
 * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
 * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
 * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。