

# Nivo+SOX(ニボルマブ+オキサリプラチン+エスワン)療法 (オブジーボ+エルプラット+ティーエスワン)

ID @PATIENTID

@PATIENTNAME 様

コース目

☺ **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
			SYSDA	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####
ニボルマブ(オブジーボ)	抗がん剤です	30分	☺																					☺
生理食塩液	経過観察	30分	☺																					☺
ホスアプレピタント(プロイメンド) パロノセトロン(アロキシ) デキサメタゾン(デキサート)	吐き気止めです	30分	☺																					☺
オキサリプラチン(エルプラット)	抗がん剤です	2時間	☺																					☺
エスワン(ティーエスワン)	抗がん剤です	朝・夕 内服	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺							☺

1回錠

## ☺ 治療による副作用

:注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目	
		@SYSDA	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####
自覚症状	過敏症																							
	食欲不振・吐き気																							
	手足のしびれ																							
	口内炎																							
	下痢																							
	手足症候群																							
	色素沈着																							
	脱毛(頭髮・まつ毛・眉毛など)																							
検査値	白血球減少																							
	赤血球減少(貧血)																							
	血小板減少																							
	肝機能低下																							

★ニボルマブはこの他に特徴的な副作用があります。詳しくはニボルマブのパンフレットをご覧ください。



- \* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- \* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- \* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- \* 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。