

ニボルマブ+イピリウム+パクリタキセル+カルボプラチン療法 (オプジーボ+ヤーポイ+タキソール+パラプラチン)

様



コース目

☺ **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			12/23	12/24	12/25	12/26	12/27	12/28	12/29	12/30	12/31	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12
			木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
ニボルマブ(オプジーボ)	抗がん剤です	30分																					
生理食塩液		30分																					
ホスアプレピタント(プロイメンド) パロノセトロン(アロキシ) デキサメタゾン(デキサート) ファモチジン(ガスター)	過敏症と吐き気を抑えるお薬です	30分																					
生理食塩液		30分																					
パクリタキセル(タキソール)	抗がん剤です	3時間																					
カルボプラチン(パラプラチン)	抗がん剤です	1時間																					
生理食塩液		15分																					

☺ 治療による副作用

:注意が必要な時期

	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	12/23	12/24	12/25	12/26	12/27	12/28	12/29	12/30	12/31	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12		
		木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	
自覚症状	過敏症																						
	食欲不振・吐き気																						
	血管痛・静脈炎																						
	口内炎																						
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																						
	手足のしびれ																						
検査値	白血球減少																						
	赤血球減少(貧血)																						
	血小板減少																						
	腎機能低下																						
	肝機能低下																						

★ニボルマブはこの他に特徴的な副作用があります。詳しくはニボルマブのパンフレットをご覧ください。



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

パクリタキセルは、水に溶けにくいためアルコールで溶解されています。お酒が弱い方、飲めない方は、前もってお伝えください。治療当日は自動車の運転など危険を伴う作業は避けてください(交通事故を起こす危険性や、酒気帯び運転になる可能性があります)