

GC(ゲムシタピン+シスプラチン)療法/ショート法

(ジェムザール+ランダ)

※1日目:約5時間、8・15日目:約1時間

ID @PATIENTID

@PATIENTNAME 様

☐ コースE

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強が残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

| 薬の名前 | 作用 | めやすの時間 | 1日目 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1日目 | | | |
|---------------------------------|------------|---------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | SYSDA ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### |
| アプレピタント(イメンド)カプセル | 吐き気止めです | 1日1回 内服 | ☉ | ☉ | ☉ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ☉ | |
| デキサメタゾン(デキサート) パロノセトロン(アロキシ) | 吐き気止めです | 15分 | ☉ | | | | | | | — | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | ☉ |
| デキサメタゾン(デキサート) | 吐き気止めです | 15分 | — | | | | | | | ☉ | | | | | | | | ☉ | | | | | | | | | | | | | | | | — |
| ゲムシタピン(ジェムザール) | 抗がん剤です | 30分 | ☉ | | | | | | | ☉ | | | | | | | | ☉ | | | | | | | | | | | | | | | | ☉ |
| ソルデム1 アスパラギン酸K 硫酸マグネシウム | 腎臓を守ります | 1時間 | ☉ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ☉ |
| マンニトール | 尿を出しやすくします | 45分 | ☉ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ☉ |
| シスプラチン(ランダ) | 抗がん剤です | 1時間 | ☉ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ☉ |
| ソルデム1 アスパラギン酸K | | 1時間 | ☉ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ☉ |


1日目は、抗がん剤の

生食5分

生食5分

この週はお休みです。

腎臓を保護するため、経口での水分補給をして頻繁に尿を出しましょう。
1日1リットル×3日間 (推奨:OS-1)



😊 治療による副作用

注意が必要な時期

| | | 1日目 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1日目 | | | | |
|------|-----------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | SYSDA ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### |
| | | SYSDA ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### |
| 自覚症状 | 発熱 | 悪寒、発熱があるときはお知らせください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 食欲不振・吐き気 | 食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 血管痛・静脈炎 | 点滴の途中に、注射部分やその周りに違和感や痛みなどがあればお知らせください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 口内炎 | 口の中が荒れて痛みが出ることがあります。歯磨き、うがいなど丁寧にしっかり行いましょう。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など) | 髪質が少し変わることもありますが、治療後半年程度でまた生えてきますので、心配すぎないでください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 手足のしびれ | 手足のしびれ、感覚が鈍などの症状が出ることがあります。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 検査値 | 白血球減少 | 感染しやすくなりますので、手洗いうがい心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 赤血球減少(貧血) | 貧血の症状(めまい・ふらつき)がでたりします。転倒に注意しましょう。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 血小板減少 | 出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 腎機能低下 | 顔や手足のむくみ、尿が少ない・出ないなどの症状が出ることがあります。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 肝機能低下 | 体がだるい、食欲がでない、皮膚のかゆみ、皮膚や白目が黄色くなるがあります。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

😊

- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。