






















リツキシマブ療法  
(リツキサン)

ID @PATIENTID

@PATIENTNAME 様

コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次の治療開始を延期することがあります。)

| 薬の名前              | 作用              | めやすの時間  | 1日目   | 2   | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8   | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15  | 16    | 17    | 18    | 19    | 20    | 21    | 1日目   |
|-------------------|-----------------|---------|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
|                   |                 |         | SYSDA   | #####   | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | #####   | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | #####   | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | #####   |
| アセトアミノフェン(カロナール)錠 | アレルギー様症状を抑える薬です | 1日1回 内服 |  |  |       |       |       |       |       |  |       |       |       |       |       |       |  |       |       |       |       |       |       |  |
| ペボタステン(タリオン)錠     |                 | 1日1回 内服 |  |   |       |       |       |       |       |  |       |       |       |       |       |       |  |       |       |       |       |       |       |  |
| ヒドロコルチゾン(ソル・コーテフ) | ステロイドです         | 30分     |  |   |       |       |       |       |       |  |       |       |       |       |       |       |  |       |       |       |       |       |       |  |
| リツキシマブ(リツキサン)     | 抗がん剤です          | 約3時間    |  |   |       |       |       |       |       |  |       |       |       |       |       |       |  |       |       |       |       |       |       |  |
| 生理食塩液             |                 | 30分     |  |   |       |       |       |       |       |  |       |       |       |       |       |       |  |       |       |       |       |       |       |  |

😊 **治療による副作用**

:注意が必要な時期

|      |           |   | 1日目    | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    | 19    | 20    | 21    | 1日目   |       |
|------|-----------|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|      |           |   | @SYSDA | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### |
| 自覚症状 | アレルギー様症状  |   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |           | 発熱や寒気、吐き気、頭痛、めまい、じんましん、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせ下さい。                 |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 検査値  | 食欲不振・吐き気  |   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |           | 食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。                        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      | 白血球減少     |   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |           | 感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。 |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      | 赤血球減少(貧血) |   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |           | 貧血の症状(めまい・ふらつき)がでたりします。転倒に注意しましょう。                                  |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      | 血小板減少     |   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |           | 出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。              |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |



- \* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- \* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- \* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- \* 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

伊那中央病院薬剤科